

• محتوای کارت : مراقبتهای بعد از عمل ختنه

- پس از ختنه به روش حلقه گذاری، طبق معمول کودک را حمام کنید و اگر توصیه خاصی توسط پزشک معالج داده نشده بگذارید محل ختنه در معرض هوا باشد.
- بهتر است هر روز کودک را حمام کنید و یا محل ختنه را با آب ولرم تمیز بشوئید .
- اگر از روش جراحی استفاده شده، کودک با پانسمان مرخص خواهد شد. اجازه دهید پانسمان خودش جدا شده و بیفتد (مگر آن که پزشک معالج دستور خاصی داده باشد) اگر پس از 4 الی 5 روز پانسمان جدا نشد در حمام پس از خیس شدن به آرامی آن را از روی آلت کودک جدا کنید. پس از آن هم نیاز به پانسمان ندارد .
- در روش حلقه گذاری ، معمولا حلقه بین 10- 5 روز خواهد افتاد. از دست کاری کردن یا کشیدن حلقه اجتناب نمایید و اجازه دهید حلقه خودبخود بیفتد .
- برای پیشگیری از تنگی مجرا ، تا یک ماه محل ادرار کودک با آب ولرم شسته شود. و به مدت 4 - 3 ماه ، پس از هر بار تعویض پوشک و نیز پس از استحمام، محل نوک آلت کودک را با پماد ویتامین A یا وازلین طبی چرب نمایید.
- پس از دفع مدفوع پوشک کودک را زود به زود تعویض کنید. به قرار معمول رفتار نمایید. فقط پوشک شل بسته شود .
- اگر دارو توسط پزشک تجویز شده، طبق دستور مصرف شود.
- ممکن است اولین نوبت ادرار پس از ختنه چند ساعتی طول بکشد. اگر احساس کردید بی قراری کودک به علت ادرار نکردن است، حمام گرم ممکن است کمک کننده باشد. در صورت ادرار نکردن کودک، به پزشک یا اورژانس بیمارستان مراجعه نمایید .

• علائم هشدار برای مراجعه فوری به پزشک یا اورژانس بیمارستان :

1- تب و وجود ترشحات بدبو در نوک آلت

2- اگر کودک دو وعده ی متوالی شیر نخورد و یا اگر کودک 6 ساعت پس از ختنه ادرار نکرده باشد .

3- جدا نشدن حلقه ، حداکثر 10 روز بعد از ختنه و اگر به نظر برسد حلقه جابجا شده

4- تنه آلت تحت فشار است (تورم آلت) که این مورد مهمترین تست است .

5- بی قراری زیاد کودک با گذشت 24 ساعت از ختنه

6- افتادن حلقه زودتر از موعد مقرر

7- خونریزی از محل ختنه

واحد آموزش به بیمار و ارتقای سلامت

با تایید از دکتر بهمن رحیمی

بیمارستان شهدای شوط

تاریخ تنظیم: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۱۱/۰۱