


پنومونی چیست؟

پنومونی عبارت است از التهاب حاد ریه ها ناشی از یک عفونت



نکته:

علائم پنومونی در عرض ۲۴-۴۸ ساعت ممکن است بطور ناگهانی تشدید شود.

علائم شایع:

سرfe: که ممکن است خشک یا همراه یا بدون خلط غلیظ زرد، سبز، قهوه ای و یا همراه رگه های خون باشد.

تنفس مشکل: ممکن است سریع، سطحی باشد و حتی در موقع استراحت هم فرد دچار سختی در تنفس باشد.

بی اشتهايی

تب یا لرز شدید

ضریبان قلب تند

ضعف

درد قفسه سینه که با نفس کشیدن بدتر می شود.



علل بوجود آورنده پنومونی:

- انواع مختلفی از باکتریها، ویروسها و قارچها می توانند موجب پنومونی یا عفونت ریه شوند.
- وارد شدن مقدار کمی غذا، استفراغ، مایعات از دهان به داخل ریه ها می تواند عامل پنومونی باشد.

درمان

پنومونی خفیف با استراحت کافی و مصرف مایعات فراوان و آنتی بیوتیک در عرض چند روز قابل درمان است. اگر چه علائم پنومونی ویروسی ممکن است چندین هفته به طول بکشد و بهبودی آن تدریجی است. نوع شدید پنومونی ممکن است نیاز به بستری در بیمارستان داشته باشد.

درمان در منزل

- بهتر است تا زمانی که کودک تب دار است کاملا استراحت نموده و فعالیت بسیار کمی داشته باشد.
- کودک تعذیه مناسب داشته باشد.



شیوع

بیماری بسیار شایعی است که میلیونها نفر در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار می دهد و علائم و نشانه های آن می تواند بسیار خفیف تا کشنده متغیر باشد. علی رغم پیشرفت های فراوان در علم پزشکی و تولید آنتی بیوتیک های قوی موجب مرگ میلیونها نفر در سراسر جهان می شود. (هفتمین عامل مرگ و میر در کشور آمریکا) کماکان مسئول یک پنجم مرگ و میرها در اطفال است.



پنومونی در کودکان



بیمارستان شهدای شوط

تاریخ تنظیم: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۱۱/۰۱

با تایید از دکتر غلامرضا آقالاری

نکته مهم:

فقط با دستور پزشک معالج از داروهای ضد سرفه استفاده کنید. چون خروج خلط به بیهوی بیمار کمک می‌کند.



علام هشدار دهنده برای مراجعه به پزشک یا اورژانس

- + تنفس با مشکل مواجهه شده است و تنفس کودک صدادار شده است. افزایش تعداد تنفس کودک یا کشیده شدن عضلات قفسه سینه به داخل کبدی لبها و مخاط کودک
- + عدم توانایی کودک در خوردن و نوشیدن و بلع
- + افزایش دمای بدن کودک

پرستاری و کودکان و نگ. ویراست دهم 2015
پرستاری کودکان مریم رسولی 2017

- استفاده از دستگاه بخار در اتاق کودک
- سیگار کشیدن و استفاده از مصرف مواد مخدر تدخینی در نزدیک کودک منوع است.
- تهویه مناسب در اتاق کودک برقرار باشد.
- داروهای تجویزی پزشک را به موقع به کودک بدھید.
- به هیچ وجه به کودک آسپرین داده نشود. ولی برای کاهش تب می‌توان از استامینوفن استفاده کرد.
- کودک باید استراحت کافی داشته باشد.
- مایعات کافی به کودک بدھید.



- از خود درمانی در منزل خودداری کنید.
- مراجعه بعدی به پزشک را از وی سوال نمایید.