


دیلاتاسیون و کورتاژ؟

باز کردن دهانه رحم و تخلیه نسج آن را گویند. این عمل یکی از شایعترین عملهای زنان است،

میتواند برای تشخیص یا درمان خونریزیهای غیرطبیعی زنان بهکار رود.

خونریزی غیر طبیعی از واژن چیست؟

در شرایط مختلف یک زن ممکن است مشکلاتی داشته باشد که منجر به خونریزی غیرطبیعی از واژن گردد. خونریزی غیرطبیعی به خونریزی گفته میشود که در زمانی خارج از انتظار ما اتفاق بیافتد.



1


موارد خونریزی غیر طبیعی واژن

1. بعد از تماس جنسی.
2. هنگام یائسگی یا بعد از آن.
3. در بین دو دوره قاعدگی به صورت لکه بینی.
4. ترشح خونی از واژن یا خونریزی در نیمه اول حاملگی.



عمل دیلاتاسیون و کورتاژ ضمن بیهوشی


عمومی یا بیحسی ناحیه‌های، بعد از اینکه شما را در وضعیت مناسبی قرار دادند که دسترسی به رحم آسان باشد، انجام میشود.



2

ابتدا دهانه رحم را متسع (باز) میکنند؛ در صورتیکه علت خونریزی سقط است، محصولات

حاملگی را خارج مینمایند و اگر علت خونریزی نامعلوم است از بافت رحم نمونه (بیوپسی) برمیدارند.



اگر پزشک شما ناحیه‌ی مشکوکی را یافت، او ممکن است یک بخش یا همهی آن را خارج کند و به آزمایشگاه بفرستد. یک آسیبشناس بافت را زیر میکروسکوپ آزمایش میکند، تا سرطان یا دیگر بیماریهای احتمالی را تشخیص دهد.



مراقبتهای بعد از عمل:

قبل از موارد زیر حتماً با پزشک خود مشورت


کنید:

1. انجام کارهای سنگین بعد از عمل جراحی.
2. داشتن تماس جنسی بعد از عمل جراحی.

3



دیلاتاسیون و کورتاژ



کتاب بارداری و زایمان ویلیامز
2022

بیمارستان شهدای شوط
تاریخ تنظیم: 1402/11/01
تاریخ بازنگری: 1403/11/01



در صورتیکه عمل شما برای خارج کردن بقایای حاملگی انجام شده، در صورت تمایل به بارداری مجدد لازم است حاملگی خود را تا 6 ماه به تاخیر اندازید تا رحم شما آمادگی لازم را پیدا کند و تصمیمگیری برای بارداری مجدد حتماً تحت نظر پزشک متخصص زنان انجام شود. ممکن است بارداری مجدد حتی دو هفته بعد از سقط انجام گیرد. برای جلوگیری از آن لازم است با پزشک خود مشورت نموده و روش مناسب و مطمئنی را برای جلوگیری از بارداری انتخاب نمایید.

بعد از کورتاژ لازم است، قرصهای آهن تجویز شده توسط پزشک را به مدت 3 ماه برای جبران کم خونی خود استفاده نمایید.

در موارد زیر لازم است به پزشک خود مراجعه

نمایید:

1. تب
2. ترشحات زیاد و غیرطبیعی
3. درد زیاد در قسمت زیر شکم
4. افزایش خونریزی
5. ترشحات بدبو
6. هر نوع حالت غیرطبیعی مثل سردی، ضعف، بیحالی، تب و غیره.

* توجه داشته باشید عمل دیلاتاسیون و کورتاژ

هیچ تاثیری در روند زندگی شما ندارد و می

توانید بعد از یک هفته استراحت بدون هیچ

مشکلی زندگی عادی خود را از سر بگیرید.